



Hexafluorine[®] käyttöohje

Fluorivetyhapon tai sen kemiallisten yhdisteiden roiskeiden huuhteluun ja hoitoon*

ALOITA HUUHTELU MINUUTIN SISÄLLÄ



Silmän huuhteluun
(10 sekunnin sisällä)



Käyte
1 Pullo
500ml



Kehon huuhteluun
(1 minuutin sisällä)



Käyte
1 DAP
5L

Hoidon jälkeen on aina mentävä lääkäriin.

Yrityksen omista hoito-ohjeista riippuen voi huuhtelun jälkeen käyttää erityisiä vastalääkkeitä kuten Kalsiumglukonaattia.

Jos huuhtelun aloittaminen viivästyy, vastalääkkeen käyttö saattaa olla tarpeellista, koska fluorivetyhapon aiheuttamien saattaa johtaa kemiallisiin reaktioihin elimistössä.

* Rajoitettu vaikutus emäksisiä kemikaaleja vastaan. Käytä tähän tarkoitukseen Diphoterine[®]:a

Hexafluorine[®] käyttöohje*

Aloita huuhtelu **minuutin sisällä** onnettomuuden tapahduttua, **suojaamattomat kehon osat** ensin.

Poista vaatteet ja/tai piilolinssit.

Jatka **kehon paljaiden osien** huuhtelua välittömästi. Älä pue päälle niitä vaatteita, jotka altistuivat kemikaaliroiskeille, tai jotka kastuivat huuhtelussa.

Ota yhteyttä lääkäriin.

YLEISOHJEET

Älä koskaan viivästyä hoidon alkua.

Parasta tulosta varten käytä Hexafluorine[®]:a **ensimmäisenä hoitomenetelmänä.**

Käytä säiliön koko sisältö.

Jos Hexafluorine[®] ei ole heti saatavilla, käytä vettä ja huuhtele sen jälkeen Hexafluorine[®]:lla niin nopeasti kuin mahdollista.

Jos hoito alkaa vasta **minuutin kuluttua onnettomuudesta**, jatka huuhteluaikaa Hexafluorine[®]:lla. Tarvittaessa jatka huuhtelua **3 – 5 kertaa se aika joka on kulunut kemikaalin altistumisesta**. Silmien huuhtelun viivästyessä huuhtelua ei kuitenkaan tarvitse jatkaa pidempään kuin 15 minuuttia.

Yrityksen omista hoito-ohjeista riippuen hoidon jälkeen voi käyttää erityisiä vastalääkkeitä kuten Kalsiumglukonaatti.

Ota sen jälkeen välittömästi yhteyttä lääkäriin.

Keittosuolaliuosta voi käyttää silmiin hoidon jälkeen. Se helpottaa nopeammin silmän toipumista normaalitilaan.

Jos **suontelo** altistuu kemikaaliroiskeille, huuhtele suuta Hexafluorine[®]:lla ja sylje neste pois.

Jos **korvakäytävä** altistuu kemikaaliroiskeille, huuhtele Hexafluorine[®]:lla niin nopeasti kuin mahdollista. Suihkuta 500ml korvakäytävään ja kallista samaan aikaan päätä sivulle, jotta neste voi valua korvasta ulos.

Kun korvaa huuhdellaan huoneenlämpöisellä nesteellä, voi esiintyä huimausta. Se ei ole vaarallista ja tunne häviää parin minuutin sisällä.

Säiliö

Pullo (500ml)
DAP (5L)

Suosittelut hoitoaika

3 minuuttia
5 minuuttia

* Rajoitettu vaikutus emäksisiä kemikaaleja vastaan. Käytä tähän tarkoitukseen Diphoterine[®]:a.



PREVOR
ANTICIPATE AND SAVE

Toxicology Laboratory & Chemical Risk Management